



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio 5 - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

Le coperture vaccinali dell'età pediatrica e dell'adolescente

Commento ai dati aggiornati al 31 dicembre 2019

Il contesto

Le coperture vaccinali (CV) rappresentano l'indicatore per eccellenza delle strategie vaccinali, poiché forniscono informazioni in merito alla loro reale implementazione sul territorio e sull'efficienza del sistema vaccinale. In Italia le coperture vengono monitorate annualmente, in maniera routinaria, richiedendo alle Regioni e Province Autonome i dati, relativi ad alcune specifiche coorti di nascita, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta. I dati autodichiarati dalle Regioni e Province Autonome vengono, poi, elaborati ai fini del calcolo della CV dall'Ufficio 5 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

Come tutti gli anni, a gennaio 2020 è stata avviata la rilevazione routinaria al 31 dicembre dell'anno precedente, richiedendo alle regioni i dati relativi alle coorti 2017, 2016 e 2015 (cicli di base entro i 24 mesi e recupero entro i 36 e i 48 mesi), 2012 e 2011 (richiami in età pre-scolare a 6 anni e recupero a 8 anni), 2001 e 2003 (richiami nell'adolescenza a 16 e 18 anni).

Sebbene universalmente la vaccinazione sia considerata uno strumento straordinariamente efficace e sicuro per la prevenzione delle malattie infettive, dal 2013 al 2016 le coperture vaccinali hanno mostrato un trend in diminuzione, scendendo ben al disotto della soglia del 95%, raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per limitare la circolazione di questi virus e batteri nella collettività e ottenere oltre alla protezione dei singoli soggetti vaccinati anche la cosiddetta immunità di gregge (o di popolazione o *herd immunity*): infatti, se almeno il 95% della popolazione è vaccinata, si proteggono indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non è stato possibile sottoporre alla vaccinazione.

I dati di copertura vaccinale al 31 dicembre 2017, relativi alle età per le quali le coperture vengono monitorate annualmente in maniera routinaria, più alcune età oggetto di un monitoraggio ad hoc, hanno mostrato un netto miglioramento rispetto all'anno precedente con una chiara inversione di tendenza. Il trend in miglioramento viene confermato anche dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre 2018 e si mantiene generalmente stabile nel 2019, con alcuni consistenti miglioramenti.

I dati

I dati di copertura vaccinale al 31 dicembre 2019 indicano che:

- la **copertura nazionale a 24 mesi** (relativa ai bambini nati nel 2017) nei confronti della polio (usata come proxy per le vaccinazioni contenute nell'esavalente) raggiunge il 95,01% perdendo uno 0,08% rispetto al 2018, ma con 14 regioni che superano il 95% e 3 che vi si avvicinano; la tendenza è in miglioramento anche nel caso della copertura per la prima dose di vaccino contro il morbillo, che arriva al 94,49%, con un +1,27% rispetto all'anno precedente, con 9 regioni che superano il 95% e solo 1 che ha una CV inferiore al 90%;
- si osserva un notevole aumento delle CV per varicella che raggiunge il 90,50% nel 2019 con un +16,27% rispetto al 2018, rotavirus (+6,71%: 19,44% nel 2018 vs 26,15% nel 2019) e meningococco B (+22,92%: 46,06% nel 2018 vs 68,98% nel 2019). Aumentano anche le coperture nei confronti della vaccinazione anti-pneumococcica (+0,11%: 91,89% nel 2018 vs 92,00% nel 2019);
- il trend generale positivo è confermato anche dalle **coperture vaccinali nazionali a 36 mesi** (relative ai bambini nati nell'anno 2016). Questo dato è utile soprattutto per monitorare la quota di bambini ritardatari, cioè che erano inadempienti alla rilevazione vaccinale dell'anno precedente e che sono stati recuperati, se pur, appunto, in ritardo. Si ritiene opportuno sottolineare che l'effettuazione delle vaccinazioni in ritardo, rispetto ai tempi previsti dal Calendario vaccinale, espone questi bambini ad un inutile rischio di malattie infettive, più frequenti e gravi nei primissimi anni di vita. Le coperture a 36 mesi mostrano valori più alti rispetto a quelle rilevate per la medesima coorte di nascita a 24 mesi l'anno precedente: ad esempio, la coorte di nascita 2016 ha una copertura vaccinale anti-polio pari a 96,17% a 36 mesi, rispetto al 95,09% rilevato l'anno prima a 24 mesi (+1,08%); l'aumento è ancora più marcato nel caso del morbillo che cresce del 1,98%, passando da 93,22% (CV a 24 mesi al 31 dicembre 2018) a 95,20% (CV a 36 mesi al 31 dicembre 2019). Anche le altre vaccinazioni contenute nell'esavalente e quelle anti-morbillo parotite e rosolia superano il 95%. Si sottolinea che eventuali confronti tra le coperture a 24 e a 36 mesi devono essere fatti considerando sempre la stessa coorte di nascita;
- l'andamento in crescita è confermato anche dalle **coperture vaccinali a 48 mesi** (relative ai bambini nati nell'anno 2015), rilevate sempre per verificare l'attività di recupero dei soggetti inadempienti: l'anti-polio passa da 94,60% (dato a 24 mesi rilevato al 31 dicembre 2017) a 96,05%, e l'antimorbillo da 91,84% a 95,16%, con un guadagno rispettivamente dell'1,45% e del 3,32%;
- riguardo alle **vaccinazioni in età pre-scolare, generalmente somministrate a 5-6 anni** (relative ai bambini nati nell'anno 2012), si registra una diminuzione del 2,09% per la quarta dose di anti-polio (90,71% nel 2018 vs 88,62% nel 2019) e dell'1,62% per la seconda dose (ciclo completo) di anti-morbillo (89,20% nel 2018 vs 87,58% nel 2019);
- per le **vaccinazioni eseguite entro gli 8 anni** (relative ai bambini nati nell'anno 2011) si registra un aumento dell'1% per quanto riguarda il morbillo (seconda dose) raggiungendo il 90,20% (rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2018 nella stessa coorte) mentre la copertura nei confronti della polio (quarta dose) aumenta dello 0,95% arrivando al 91,66%;
- riguardo alle coperture per le **vaccinazioni effettuate nell'adolescenza**, la rilevazione è stata fatta su due coorti: i sedicenni (coorte 2003) e i diciottenni (coorte 2001). Anche per queste coorti si conferma un miglioramento delle coperture vaccinali, anche se più limitato rispetto

al passato: l'anti-difterica (quinta dose) nei sedicenni aumenta dello 0,44% (70,43% nel 2018 vs 70,87% nel 2019) e l'antimorbillo (seconda dose) guadagna il 3,90% (85,72% nel 2018 vs 89,62% nel 2019); nei diciottenni si osserva un aumento del 3,33% per anti-difterica e dell'1,38% per la seconda dose di anti-morbillo.

Differenze tra le regioni

Come per gli altri anni, anche nel 2019 si sono registrate differenze tra le regioni, anche se negli ultimi anni si sta notevolmente riducendo la forbice. In particolare, la copertura a 24 mesi contro la polio è inferiore al 90% solo nella P.A. di Bolzano (81,18%), mentre nelle altre si va dal 91,14% della Sicilia al 97,47% dell'Abruzzo, con 14 regioni che superano la soglia del 95%.

Si attenuano anche le differenze rilevate nella copertura vaccinale per morbillo: sebbene il range sia apparentemente ampio (dal 75,53% nella P.A. di Bolzano al 96,11% in Toscana), a parte la P.A. di Bolzano nessuna regione ha coperture inferiori al 91% e 9 regioni hanno una copertura superiore al 95%, raccomandata dall'OMS.

È da sottolineare l'aumento della copertura vaccinale contro la varicella, che, col PNPV 2017 -2019 è stata offerta attivamente, gratuitamente e obbligatoriamente a partire dai nati nel 2017. L'obiettivo di raggiungere una CV $\geq 95\%$ per la prima e la seconda dose non è stato tuttavia ancora raggiunto.

È necessario proseguire l'impegno, in termini di miglioramento dell'offerta e dell'accesso ai servizi, ma anche della capacità di rispondere alle istanze dei cittadini per dissolvere i dubbi sulla efficacia e sicurezza dei vaccini e sull'utilità ed opportunità delle vaccinazioni, anche nei confronti di malattie solo apparentemente scomparse, per garantire un ottimale livello di protezione della popolazione.

REGIONE/P.A.	Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2019 (coorte 2017)															
	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC	EP A	ROTA	Men B	Men ACYW
Piemonte	95,96	95,99	96,00	95,98	95,90	95,81	95,56	95,52	95,55	91,77	91,20	92,71	0,75	18,68	81,37	0,67
Valle d'Aosta	93,24	93,24	93,24	93,24	93,01	93,01	91,54	91,43	91,54	80,05	87,82	88,50	0,56	1,13	65,28	0,23
Lombardia	95,88	95,83	95,83	95,82	95,73	95,68	95,56	95,48	95,52	94,07	93,25	95,89	1,03	8,99	56,35	0,75
Prov. Aut. Bolzano	81,18	81,14	81,16	81,13	81,09	81,13	75,53	75,48	75,51	73,24	68,07	76,44	0,95	23,63	47,29	0,82
Prov. Aut. Trento	94,93	94,93	94,93	94,93	94,89	94,87	95,48	95,44	95,46	90,97	90,50	91,39	3,68	2,60	78,94	0,97
Veneto	95,19	95,17	95,20	95,17	95,00	95,01	95,12	95,04	95,11	93,72	92,26	89,67	10,21	25,99	84,81	91,70
Friuli-Venezia Giulia	93,36	93,36	93,39	93,36	92,96	92,84	92,49	92,49	92,49	90,64	88,15	87,59	2,04	22,30	77,29	2,49
Liguria	95,63	95,63	95,63	95,63	95,50	95,31	93,15	92,95	92,96	89,93	89,57	93,03	2,64	39,68	86,38	8,58
Emilia-Romagna	95,83	95,82	95,85	95,82	95,83	95,52	95,21	95,05	95,15	91,04	92,04	93,38	2,87	26,34	83,14	91,17
Toscana	96,76	96,77	96,79	96,77	96,55	97,20	96,11	96,04	96,08	94,59	91,05	92,34	0,55	23,25	80,76	4,65
Umbria	96,12	96,12	96,12	96,12	96,20	96,09	95,23	95,13	95,21	88,59	87,58	93,87	0,69	1,04	79,45	0,79
Marche	94,75	94,53	94,53	94,54	94,49	94,15	93,75	93,68	93,69	90,21	83,29	90,87	1,11	9,77	65,77	82,17
Lazio	95,58	95,55	95,54	95,54	95,51	95,46	95,72	95,70	95,71	91,00	73,58	92,08	0,31	38,43	68,93	70,40
Abruzzo	97,47	97,48	97,48	97,48	97,42	97,46	95,05	95,04	95,04	87,87	55,72	93,01	0,23	13,44	66,87	24,67
Molise	97,08	97,08	97,08	97,08	97,27	97,08	93,39	93,39	93,39	89,42	53,90	96,60	0,48	1,20	65,10	59,21
Campania	95,05	95,05	95,05	95,05	95,03	95,02	94,67	94,67	94,67	86,96	66,65	89,97	0,06	4,00	52,75	63,91
Puglia	94,54	94,56	94,56	94,56	94,55	94,45	94,38	94,38	94,39	93,35	84,38	91,88	66,10	53,04	64,33	82,56
Basilicata	96,56	96,56	96,56	96,56	96,56	96,56	92,57	92,57	92,57	90,43	64,53	95,82	0,00	24,18	91,01	64,40
Calabria	96,04	96,04	96,04	96,04	96,04	96,04	93,08	93,08	93,08	69,68	81,58	94,32	0,14	72,43	84,93	81,58
Sicilia	91,14	91,13	91,13	91,13	91,15	91,11	92,20	92,19	92,20	90,28	33,26	87,92	0,07	54,29	62,14	71,98
Sardegna	95,21	95,21	95,20	95,21	95,21	95,16	93,61	93,56	93,60	89,35	84,21	93,57	0,16	35,93	68,09	11,25
Italia	95,01	94,99	95,00	94,99	94,93	94,89	94,49	94,44	94,47	90,50	79,44	92,00	5,76	26,15	68,98	46,58

Legenda:

- (a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi
- (b) Ciclo di base 1, 2 o 3 dosi, secondo l'età
- (c) 1a dose entro 24 mesi
- (d) Ciclo completo secondo il prodotto o il calendario
- n.d. Non disponibile

POL	Polio(a)	ROS	Rosolia (c)
DIF	Difterite (a)	VAR	Varicella (c)
TET	Tetano (a)	Men C	Meningococco C coniugato (b)
PER	Pertosse (a)	PNC	Pneumococco coniugato (b)
EP B	Epatite B(a)	EP A	Epatite A (d)
HIB	Hib(b)	ROTA	Rotavirus (d)
MOR	Morbillio(c)	Men B	Meningococco B (d)
PAR	Parotite (c)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato (c)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020

REGIONE/P.A.	Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2019 (coorte 2016)															
	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC	EP A	ROTA	Men B	Men ACYW
Piemonte	96,81	96,86	96,87	96,86	96,72	96,47	96,43	96,38	96,41	50,79	92,71	93,24	1,39	n.d.	20,39	0,82
Valle d'Aosta	95,30	95,19	95,51	95,19	94,78	94,57	94,36	93,83	94,25	42,84	89,55	91,22	0,42	n.d.	19,96	0,21
Lombardia	96,01	95,97	95,98	95,95	95,82	95,38	95,61	95,48	95,56	77,56	93,18	92,77	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	89,15	89,17	89,19	89,17	88,93	88,77	83,57	83,54	83,56	64,83	73,88	83,54	1,44	n.d.	27,89	1,28
Prov. Aut. Trento	95,84	95,90	95,94	95,84	95,75	95,24	95,84	95,77	95,84	76,18	92,27	91,97	4,99	n.d.	57,90	1,53
Veneto	95,56	95,54	95,65	95,54	95,26	94,71	95,41	95,29	95,39	91,38	91,52	90,38	11,88	11,58	87,43	91,37
Friuli-Venezia Giulia	94,29	94,26	94,33	94,24	93,69	93,41	94,08	94,08	94,08	86,54	89,61	87,75	4,51	n.d.	76,42	3,00
Liguria	97,39	97,41	97,41	97,36	97,20	96,72	96,31	95,89	95,89	82,35	91,35	94,41	3,07	n.d.	85,08	31,23
Emilia-Romagna	96,88	97,17	97,27	97,17	96,98	96,33	96,74	96,54	96,67	80,77	94,10	94,34	9,03	n.d.	32,51	92,98
Toscana	95,72	95,74	95,81	95,73	95,49	95,95	95,67	95,60	95,65	90,93	90,76	92,31	1,16	n.d.	82,21	11,38
Umbria	97,05	97,05	97,06	97,05	96,94	96,81	96,83	96,70	96,81	45,86	91,50	94,65	1,20	n.d.	17,21	1,12
Marche	95,52	95,36	95,37	95,35	95,23	94,81	94,95	94,84	94,82	77,59	80,17	91,77	1,19	27,82	27,82	62,02
Lazio	95,10	95,06	95,07	95,05	94,95	94,86	95,42	95,40	95,41	63,40	89,70	90,87	0,19	n.d.	42,29	66,79
Abruzzo	98,22	98,22	98,22	98,22	98,12	98,22	90,77	90,70	90,76	52,13	67,86	94,35	0,39	20,65	20,65	17,12
Molise	97,86	97,86	97,86	97,86	98,38	97,86	94,72	94,72	94,72	87,44	71,36	97,24	0,10	15,84	15,84	22,03
Campania	98,26	98,25	98,25	98,25	98,22	98,16	97,97	97,95	97,96	73,63	70,90	92,80	0,13	n.d.	11,73	56,65
Puglia	96,28	96,22	96,22	96,22	96,17	96,05	96,29	96,21	96,21	93,70	87,79	93,07	77,08	n.d.	63,25	54,33
Basilicata	97,14	97,14	97,14	97,14	97,14	97,14	97,83	97,83	97,83	92,20	92,55	96,76	0,00	n.d.	84,17	12,75
Calabria	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	78,74	78,74	78,74	69,26	35,92	95,01	0,48	82,74	83,37	35,92
Sicilia	95,35	95,34	95,35	95,34	95,33	95,26	95,80	95,77	95,79	93,79	55,11	90,71	0,09	n.d.	68,91	51,07
Sardegna	95,76	95,77	95,77	95,77	95,68	95,67	95,06	95,04	95,06	79,95	88,16	93,62	0,19	22,73	42,28	3,21
Italia	96,17	96,18	96,21	96,17	96,05	95,82	95,20	95,11	95,16	77,47	83,23	92,36	8,53	6,57	49,66	48,04

Legenda:

- (a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi
- (b) Ciclo di base 1, 2 o 3 dosi, secondo l'età
- (c) 1a dose
- (d) Ciclo completo secondo il prodotto o il calendario
- n.d. Non disponibile

POL	Polio(a)	ROS	Rosolia (c)
DIF	Difterite (a)	VAR	Varicella (c)
TET	Tetano (a)	Men C	Meningococco C coniugato (b)
PER	Pertosse (a)	PNC	Pneumococco coniugato (b)
EP B	Epatite B(a)	EP A	Epatite A (d)
HIB	Hib(b)	ROTA	Rotavirus (d)
MOR	Morbillo(c)	Men B	Meningococco B (d)
PAR	Parotite (c)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato (c)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020

REGIONE/P.A.	Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2019 (coorte 2015)															
	POL	DIF	TET	PER	EP B	HIB	MOR	PAR	ROS	VAR	Men C	PNC	EP A	ROTA	Men B	Men ACYW
Piemonte	96,63	96,61	96,67	96,60	96,30	95,78	96,47	96,41	96,45	8,95	92,96	92,52	1,76	n.d.	13,94	0,72
Valle d'Aosta	95,43	95,12	95,64	95,12	94,81	94,50	94,91	94,70	94,91	11,42	90,03	90,76	0,83	n.d.	21,39	0,21
Lombardia	96,09	96,04	96,12	96,01	95,83	94,99	95,65	95,40	95,53	9,00	92,80	90,77	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	91,13	91,07	91,16	91,00	90,53	90,17	87,70	87,67	87,76	31,93	76,69	83,54	2,36	n.d.	22,48	1,19
Prov. Aut. Trento	96,41	96,29	96,51	96,22	96,31	95,38	96,47	96,45	96,45	67,58	92,47	90,78	6,05	n.d.	39,35	1,47
Veneto	95,78	95,73	96,03	95,71	95,36	93,92	95,68	95,55	95,63	90,58	91,19	93,82	13,13	6,96	84,58	91,04
Friuli-Venezia Giulia	94,19	94,26	94,48	94,25	93,58	92,62	94,90	94,90	94,90	84,40	90,19	85,94	5,76	n.d.	62,65	3,36
Liguria	97,67	97,65	97,66	97,65	97,41	96,85	95,18	94,91	95,03	73,06	90,32	92,31	5,25	n.d.	80,36	17,92
Emilia-Romagna	96,53	96,42	96,63	96,41	96,21	94,97	96,11	95,87	96,00	19,95	94,02	92,37	12,13	n.d.	29,08	93,88
Toscana	95,87	95,82	95,99	95,79	95,73	96,23	95,54	95,45	95,51	89,97	91,23	90,84	1,39	n.d.	78,76	14,13
Umbria	97,70	97,63	97,72	97,61	97,58	97,29	97,23	97,19	97,24	8,08	93,03	99,80	1,87	n.d.	17,17	0,91
Marche	95,11	94,83	94,95	94,82	94,64	93,47	94,72	94,43	94,42	65,08	84,86	89,69	1,93	n.d.	16,89	35,96
Lazio	95,76	95,63	95,66	95,64	95,42	95,12	95,65	95,61	27,06	91,59	91,59	90,02	0,33	n.d.	42,59	47,43
Abruzzo	98,62	98,61	98,61	98,60	98,52	98,50	92,70	92,64	92,66	45,59	74,21	91,56	0,49	n.d.	18,43	16,41
Molise	96,93	96,93	96,93	96,93	96,89	96,93	95,60	95,60	95,60	80,08	81,23	95,60	0,23	n.d.	8,70	4,03
Campania	94,92	94,92	94,92	94,91	94,88	94,77	94,30	94,27	94,28	63,35	71,56	84,64	0,16	n.d.	11,84	14,09
Puglia	96,93	96,87	96,89	96,87	96,81	96,25	96,82	96,76	96,77	94,82	89,19	94,16	80,25	n.d.	61,47	9,28
Basilicata	98,88	98,88	98,88	98,88	98,88	98,88	97,50	97,50	97,50	93,95	95,12	98,34	0,05	n.d.	83,96	0,95
Calabria	93,23	93,23	93,23	93,23	93,23	93,21	81,92	81,92	81,92	80,68	49,56	92,04	0,39	0,00	52,15	67,44
Sicilia	97,10	97,10	97,10	97,09	97,08	96,88	96,89	96,84	96,88	92,69	69,51	92,07	0,12	n.d.	51,24	12,79
Sardegna	96,73	96,72	96,74	96,68	96,71	96,63	95,25	95,23	95,01	85,61	92,12	95,50	0,27	n.d.	37,45	1,50
Italia	96,05	96,00	96,08	95,98	95,83	95,29	95,16	95,04	88,21	58,42	85,69	91,08	7,70	n.d.	36,01	27,19

Legenda:

- (a) Ciclo vaccinale di base completo = 3 dosi
- (b) Ciclo di base 1, 2 o 3 dosi, secondo l'età
- (c) 1a dose
- (d) Ciclo completo secondo il prodotto o il calendario
- n.d. Non disponibile

POL	Polio(a)	ROS	Rosolia (c)
DIF	Difterite (a)	VAR	Varicella (c)
TET	Tetano (a)	Men C	Meningococco C coniugato (b)
PER	Pertosse (a)	PNC	Pneumococco coniugato (b)
EP B	Epatite B(a)	EP A	Epatite A (d)
HIB	Hib(b)	ROTA	Rotavirus (d)
MOR	Morbillio(c)	Men B	Meningococco B (d)
PAR	Parotite (c)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato (c)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020

Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2019 (coorte 2012)								
Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni eseguite a 5-6 anni, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)								
REGIONE/P.A.	MOR	PAR	ROS	VAR	DIF	TET	PER	POL
Piemonte	93,81	93,81	93,81	4,73	92,97	93,13	92,86	93,13
Valle d'Aosta	89,74	89,47	89,65	3,16	89,74	90,61	89,39	90,09
Lombardia	91,85	91,25	91,51	12,63	91,66	91,82	91,47	91,81
Prov. Aut. Bolzano	78,24	77,85	77,94	19,31	81,34	81,41	81,20	81,36
Prov. Aut. Trento	91,58	91,33	91,41	9,78	90,70	91,21	90,50	90,77
Veneto	88,98	88,60	88,82	83,12	88,93	89,73	88,54	89,00
Friuli-Venezia Giulia	88,70	88,70	88,70	66,22	89,00	89,55	88,77	89,13
Liguria	86,32	86,11	86,21	18,76	88,06	88,09	87,92	88,00
Emilia-Romagna	91,52	91,52	91,22	24,05	91,49	91,87	91,30	91,95
Toscana	91,92	91,69	91,81	84,30	91,16	91,60	91,06	91,21
Umbria	93,20	93,02	93,13	17,90	93,08	93,05	93,04	92,92
Marche	88,19	87,59	87,59	26,20	89,20	89,44	89,15	88,62
Lazio	85,42	85,20	85,24	14,40	87,48	87,54	87,43	87,50
Abruzzo	88,09	88,08	88,09	18,79	93,14	93,12	93,13	93,17
Molise	92,64	92,64	92,64	60,91	90,78	90,78	90,78	90,78
Campania	79,00	78,91	78,94	12,55	80,82	80,91	80,79	80,55
Puglia	88,23	88,18	88,21	84,57	87,55	87,56	87,54	87,58
Basilicata	84,92	84,92	84,92	80,13	90,30	90,30	90,30	90,30
Calabria	78,62	78,62	78,62	59,65	91,07	91,07	91,07	91,07
Sicilia	81,42	81,33	81,38	75,25	82,90	82,90	82,88	82,87
Sardegna	88,42	88,39	88,39	71,67	89,24	89,48	89,45	89,07
Italia	87,58	87,36	87,43	38,36	88,59	88,79	88,47	88,62

Legenda:

(e) seconda dose
(f) quarta dose

n.d. Non disponibile

MOR	Morbo (e)
PAR	Parotite (e)
ROS	Rosolia (e)
VAR	Varicella (e)
DIF	Difterite (f)
TET	Tetano (f)
PER	Pertosse (f)
POL	Polio (f)

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE
Aggiornamento 18 Giugno 2020

Vaccinazioni dell'età pediatrica. Anno 2019 (coorte 2011)												
Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni eseguite entro gli 8 anni, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)												
REGIONE/P.A.	MOR	PAR	ROS	VAR	DIF	TET	PER	POL	Hib	EP B	MPRV: prima dose (g)	MPRV: seconda dose (h)
Piemonte	93,71	93,71	93,71	4,01	93,92	94,04	93,86	93,80	95,27	96,73	0,33	0,17
Valle d'Aosta	91,44	91,28	91,36	2,77	91,95	92,79	91,61	91,95	94,04	95,22	0,17	0,25
Lombardia	92,15	91,49	91,71	2,84	92,54	92,68	92,64	92,68	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	81,72	81,43	81,52	16,70	85,46	85,60	85,26	85,44	91,61	92,97	33,53	31,96
Prov. Aut. Trento	92,90	92,73	92,77	6,41	92,73	93,28	92,55	92,88	93,11	95,46	0,00	0,00
Veneto	91,24	90,74	91,03	85,03	91,62	92,27	91,44	91,70	93,88	95,24	36,04	72,80
Friuli-Venezia Giulia	90,47	90,47	90,47	47,08	91,35	91,78	91,13	91,39	92,84	94,70	36,57	46,52
Liguria	89,69	89,26	89,37	19,50	90,76	91,10	90,79	90,81	82,33	83,04	7,65	4,54
Emilia-Romagna	94,17	93,56	93,84	16,25	94,13	94,44	93,87	94,49	94,10	96,08	14,44	0,53
Toscana	91,37	92,33	91,28	84,18	92,33	92,64	92,18	92,27	95,25	95,63	81,47	51,48
Umbria	95,06	94,97	95,02	4,81	95,46	95,47	95,47	95,36	96,96	97,89	6,38	2,01
Marche	92,32	91,70	91,70	22,89	93,28	93,38	93,24	93,03	94,58	89,87	17,03	1,82
Lazio	88,87	88,69	88,71	13,18	90,52	90,53	90,44	90,51	96,49	97,47	10,98	1,98
Abruzzo	92,52	92,54	92,56	17,26	95,62	95,63	95,60	95,68	84,13	84,33	11,42	6,70
Molise	94,90	94,90	94,90	57,82	94,14	94,14	94,14	94,14	60,41	60,79	45,03	11,34
Campania	84,35	84,26	84,29	11,87	86,44	86,44	86,44	86,18	0,67	1,30	9,38	0,88
Puglia	92,68	92,57	92,65	88,77	92,38	92,50	92,48	92,57	96,16	97,57	92,77	65,26
Basilicata	96,89	96,89	96,89	91,19	98,15	98,15	98,15	98,15	35,08	35,17	62,81	63,99
Calabria	80,73	80,73	80,73	64,84	93,98	93,98	93,98	93,98	94,66	94,66	14,26	36,54
Sicilia	86,95	86,85	86,88	83,05	89,87	89,87	89,84	90,26	97,03	74,56	67,77	44,63
Sardegna	87,49	87,44	87,43	66,41	89,43	89,43	89,38	89,29	87,20	87,84	55,27	50,29
Italia	90,20	89,97	90,02	36,32	91,61	91,77	91,56	91,66	67,53	66,25	27,01	21,74

Legenda:

(e) seconda dose

(f) quarta dose

n.d. Non disponibile

MOR	Morboillo (e)	EP B	Epatite B
PAR	Parotite (e)	Hib	Haemophilus influenzae
ROS	Rosolia (e)	MEN C	Meningococco C coniugato
VAR	Varicella (e)	PNC	Pneumococco coniugato
DIF	Difterite (f)		
TET	Tetano (f)		
PER	Pertosse (f)		
POL	Polio (f)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2019 (coorte 2003 - 16 anni)													
Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)													
REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	83,61	83,78	82,08	97,44	95,51	97,38	95,32	97,38	95,36	82,37	83,89	3,09	80,61
Valle d'Aosta	87,68	88,02	85,91	96,03	93,76	96,03	93,08	95,95	93,33	84,30	88,02	1,18	82,78
Lombardia	76,39	76,61	74,70	96,38	93,99	96,09	92,81	96,20	93,10	n.d.	75,83	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	72,79	73,43	70,58	91,04	86,58	90,78	86,27	90,87	86,27	63,17	75,92	4,81	32,90
Prov. Aut. Trento	87,27	87,71	85,86	95,29	93,90	95,29	93,41	95,29	93,55	86,72	19,97	3,80	85,66
Veneto	85,64	86,27	84,40	96,57	94,15	96,38	93,21	96,33	93,48	89,12	84,16	9,29	82,97
Friuli-Venezia Giulia	74,41	75,32	73,50	95,22	93,21	95,05	92,59	95,12	92,72	73,48	74,44	4,42	70,31
Liguria	75,32	75,77	74,45	83,44	81,58	83,42	81,28	83,44	81,74	52,75	83,99	4,02	74,79
Emilia-Romagna	90,60	90,99	88,46	96,34	93,70	96,20	92,74	96,23	93,07	92,66	97,64	8,76	91,35
Toscana	81,26	81,88	80,52	89,97	88,20	90,23	88,27	90,18	88,26	79,17	62,21	2,94	78,53
Umbria	87,73	87,85	87,89	98,00	97,14	97,82	96,87	97,93	96,99	83,87	86,34	3,51	10,25
Marche	78,64	78,81	77,79	95,94	94,14	95,78	92,34	95,79	92,34	67,00	76,68	2,56	66,94
Lazio	65,90	65,96	65,55	94,75	87,98	94,61	87,49	94,63	87,52	54,10	51,37	0,91	47,32
Abruzzo	83,05	83,06	82,86	45,90	90,67	45,90	90,68	45,91	90,68	29,61	76,41	0,86	47,47
Molise	64,39	64,39	64,39	93,69	91,79	93,69	91,79	93,69	91,79	61,70	53,79	0,82	36,66
Campania	42,93	42,96	42,55	92,21	85,09	92,19	85,01	92,21	85,06	29,01	39,59	0,62	27,69
Puglia	69,72	69,74	69,59	96,88	93,39	96,82	93,29	96,82	93,33	76,35	68,97	78,89	75,92
Basilicata	86,61	86,61	86,61	91,77	87,20	91,77	87,20	91,77	87,20	26,46	78,81	0,55	76,80
Calabria	60,49	60,49	60,49	71,66	57,87	71,66	57,96	71,66	57,87	36,93	53,21	0,35	49,96
Sicilia	49,05	49,08	48,71	96,23	86,91	96,18	86,73	96,21	87,26	47,26	49,32	0,22	45,32
Sardegna	70,81	70,82	70,49	91,11	85,37	91,04	85,22	91,07	85,28	52,46	44,59	0,52	36,53
Italia	70,87	71,09	69,98	93,10	89,62	93,01	89,12	93,03	89,28	52,42	66,68	9,57	74,92

Legenda:

(i) 5a dose

(I) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(I)
MOR 1	Morbillio (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillio (seconda dose)	Men ACY Meningococco ACYW coniugato	
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
	86,59	86,90	85,45	96,21	92,84	95,72	92,51	95,75	92,57	83,64	17,84	2,94	46,49
Piemonte	86,59	86,90	85,45	96,21	92,84	95,72	92,51	95,75	92,57	83,64	17,84	2,94	46,49
Valle d'Aosta	89,47	90,73	88,71	93,85	90,56	93,60	88,71	93,60	88,80	87,11	6,91	1,94	48,10
Lombardia	82,25	82,65	79,56	93,84	90,20	93,37	88,23	93,48	88,54	n.d.	10,33	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	71,93	72,91	66,92	89,71	84,13	89,31	83,52	89,29	83,64	34,30	64,72	4,74	33,16
Prov. Aut. Trento	86,69	87,16	84,44	93,84	90,69	93,70	89,05	93,73	89,21	85,01	5,69	4,32	84,29
Veneto	87,94	88,88	86,19	94,82	91,49	94,39	89,94	94,51	90,14	48,39	86,53	8,43	64,66
Friuli-Venezia Giulia	81,29	82,44	79,97	93,26	90,38	93,02	89,24	93,04	89,45	75,66	80,13	3,84	73,46
Liguria	79,53	79,75	78,77	81,41	78,11	80,41	76,98	80,80	77,63	40,19	84,12	3,32	71,71
Emilia-Romagna	89,49	89,98	86,10	94,00	90,51	93,76	89,08	93,84	89,41	89,69	95,89	7,17	58,47
Toscana	83,32	84,15	81,64	85,41	85,01	84,98	84,39	85,01	84,49	76,53	25,64	2,94	75,54
Umbria	91,89	92,00	91,71	96,54	95,19	96,20	94,78	96,31	94,90	82,32	95,70	3,46	64,63
Marche	85,06	85,27	83,18	95,52	89,10	94,95	87,36	94,92	87,34	67,74	84,62	2,58	53,93
Lazio	63,23	63,43	63,43	87,09	77,66	86,85	76,62	86,86	76,64	37,97	63,38	0,98	34,00
Abruzzo	87,28	87,28	86,98	44,30	90,68	44,28	90,67	44,29	90,67	45,40	57,99	0,76	30,42
Molise	67,84	67,84	67,84	93,19	90,13	93,19	90,13	93,19	90,13	54,75	47,98	0,71	32,54
Campania	55,15	55,23	53,86	89,16	78,81	89,12	78,27	89,14	78,32	24,94	27,45	0,85	23,87
Puglia	71,39	71,43	71,07	94,63	88,07	94,58	87,95	94,61	88,00	77,38	70,33	75,31	69,22
Basilicata	84,55	84,55	84,55	86,45	81,00	86,45	81,00	86,45	81,00	7,55	70,16	0,70	64,22
Calabria	62,46	62,46	62,46	71,88	56,76	71,88	56,76	71,88	56,76	36,93	56,17	0,08	45,16
Sicilia	50,67	51,91	50,39	94,13	79,39	92,94	79,23	92,63	78,97	36,77	46,47	0,34	35,60
Sardegna	75,38	75,43	74,04	89,58	83,85	89,57	83,71	89,59	83,74	40,65	44,89	0,71	33,18
Italia	74,28	74,71	72,91	90,33	84,93	89,96	84,02	89,98	84,13	44,96	48,74	9,19	58,31

Legenda:

(i) 5a dose

(I) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(I)
MOR 1	Morillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morillo (seconda dose)	Men ACY	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020